

عنوان مقاله:

پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس استرس مزمن (CSS) در میان بستگان درجه یک بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

محل انتشار:

فصلنامه روانشناسی سلامت، دوره 2، شماره 7 (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 16

نویسندگان:

حمید شمسی پور - دانشجوی دکترای روان شناسی سلامت، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

محمدعلی بشارت* - استاد گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

حمیده جعفریزدی - کارشناس ارشد روان شناسی، دانشگاه پیام نور

اسدالله رجب - متخصص اطفال و دیابت، رئیس انجمن دیابت ایران

هادی بهرامی احسان - دانشیار، دکترای روان شناسی، رئیس دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس استرس مزمن (CSS) در نمونه ای از بستگان نسبی درجه یک بیماران دچار دیابت نوع دو بود. [۱] روش: نسخه انگلیسی CSS پس از ترجمه و بازترجمه، به پرسشنامه فارسی تبدیل شد و سپس در میان ۱۹۹ شرکت کننده ی پژوهش به کار گرفته شد. برای بررسی پایایی بازآزمایی، ۳۰ نفر از شرکت کنندگان ۸ تا ۱۱ هفته پس از آزمون اول دوباره به پرسش ها پاسخ گفتند. [۲] یافته ها: همسانی درونی CSS با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، برای کل مقیاس ۸۷٪ به دست آمد. ضریب همبستگی CSS با مقیاس شخصیت نوع D، مولفه ی نوروزگرایی EPQ-RS، مولفه ی افسردگی مقیاس های DAS، و مولفه ی خشم و خصومت SCL-۹۰-R به ترتیب ۳۶٪، ۳۴٪، ۳۸٪ و ۳۰٪ به دست آمد. پایایی بازآزمایی با فاصله ۸ تا ۱۱ هفته میان دو بار اجرا ۷۳٪ به دست آمد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر، نسخه فارسی مقیاس CSS شرایط لازم برای کاربرد در پژوهش های روان شناختی روی جمعیت های ایرانی در معرض خطر بیماری های مزمن را دارد.

کلمات کلیدی:

مقیاس استرس مزمن، همسانی درونی، پایایی بازآزمایی، روایی همزمان

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1909811>

