

عنوان مقاله:

بررسی مدیریت پرورش گاوشیری در گاوداری های صنعتی استان مازندران

محل انتشار:

همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

سیدایوب تقیان - دانشجوی دوره کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

کاوه جعفری خورشیدی - استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

خلاصه مقاله:

این تحقیق جهت دستیابی به اطلاعات اولیه در مورد گاوداری های صنعتی استان مازندران و وضعیت پرورش گاو شیری در واحدهای مذکور که قسمت عمده آن را گاو هلشتاین تشکیل می دهد، انجام گرفت. این طرح با استفاده از روش پرسشنامه ای، مراجعه مستقیم و نمونه برداری از خوراک و شیر انجام پذیرفت و اطلاعات تولید مثلی، تغذیه ای، مدیریتی و تولید گرد آوری شد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که متوسط تولید شیر روزانه، طول دوره شیردهی، درصد چربی و طول دوره خشکی به ترتیب $4/41 \pm 17/81$ ؛ $269/3 \pm 32/6$ ؛ $3/42 \pm 0/8$ درصد و $66/1 \pm 8/625$ روز بوده است. هم چنین متوسط سن اولین زایش، فاصله بین دو زایش، تعداد زایش، اولین فحلی پس از زایش، تعداد برگشتی فاصله زایمان، میزان دو قلو زایی، سخت زایی و سقط جنین به ترتیب $12/72 \pm 1/05$ ، $26/61 \pm 1/76$ ، $3/45 \pm 1/70$ ، $61/3 \pm 27/3$ ، $1/8 \pm 0/85$ ، $3/1$ ، $2/7$ ، $3/5$ درصد بوده است. نحوه شیرخوردن گوساله در اغلب واحدها بصورت دستی و تغذیه با سطل یا پستانک بوده که در دو وعده صبح و عصر به اندازه 10 % وزن بدن تغذیه می شدند. متوسط سن شروع مصرف خوراک 14 ± 6 روز و 8 % گوساله ها تا سن سه ماهگی تلف می شدند. ترکیب سنی گاوهای شیری استان 32/9 % بالای 8 سال، 26 % بین 4-8 سال و 41/1 % کوچکتر از 4 سال و ترکیب گله نیز 34/63 درصد گاو شیرده، 23/8 درصد تلیسه، 10/8 درصد گاو خشک 9/79 درصد نر و 20/7 درصد گوساله بودند. ظرفیت واحد های گاوداری استان 65 درصد 20-50 راس، 20 درصد 50-100 راس، 10 درصد 100-500 راس و 5 درصد بالای 500 راس وجود داشتند. از نظر سیستم جایگاه حدود 91/5 درصد گاوداری ها دارای جایگاه نیمه باز، 4/5 درصد بسته و 4 درصد بصورت بسته + نیمه باز بودند.

کلمات کلیدی:

مدیریت مزرعه، گاو شیری، صنعتی، مازندران

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/322364>

