

عنوان مقاله:

بررسی فلور، شکل زیستی و کوبوتیپ های گیاهان دارویی جنگل های شرق استان اردبیل

محل انتشار:

همایش ملی گیاهان دارویی (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

اردوان قربانی - استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی

حسین کاویان پور - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

علی تیمورزاده - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

خلاصه مقاله:

رویشگاه جنگلی مورد مطالعه در 24 کیلومتری شرق و شمال شرقی شهر اردبیل و در 9 کیلومتری شرق شهر نمین در موقعیت 22 دقیقه، 38 درجه و 24 دقیقه، 38 درجه عرض شمالی و 31 دقیقه، 48 درجه و 34 دقیقه، 48 درجه طول شرقی در سطح 913 هکتار گسترش دارد از سطح فوق 252 هکتار عرصه جنگلی و بررسی فلور دارویی صرفا در این سطح صورت گرفته است به منظور بررسی پوشش گیاهی عرصه پس از بررسی های اولیه و مرور منابع موجود و بازدیدهای میدانی در ارتفاعات مختلف با در نظر گرفتن دامنه های مختلف (جهات و شیب ها) اقدام به جمع آوری و شناسایی گیاهان با پیمایش میدانی گردید در مرحله بعد انواع گیاهان بر اساس دارویی با تطبیق با منابع مرتبط، اشکال زیستی به روش رانکایر (Raunkiaer) و کورولوژی گونه ها از فلور های موجود و شالوده ژئوبوتانیکی ایران تعیین گردید در این منطقه 135 گونه شناسایی شده است که متعلق به 45 تیره و 112 جنس گیاهی می باشند از بین این گیاهان 48 گونه دارای خاصیت دارویی می باشند تیره های Asteraceae، Rosaceae، Fabaceae بیشترین فراوانی گیاهان دارویی را در منطقه دارا می باشند نتایج طبقه بندی گیاهان دارویی منطقه از نظر شکل زیستی به روش رانکایر در منطقه نشان داد که گیاهان همی کریتوفیت (He) با 41/66 درصد (20 گونه)، گیاهان فانروفیت (Ph) با 33/33 درصد (16 گونه) فراوان ترین اشکال زیستی منطقه را تشکیل می دهند پراکنش جغرافیایی گیاهان دارویی منطقه نشان داد که 35/41 گونه ها (17 گونه) به ناحیه رویشی اروپا - سبیری و ایران- تورانی، 25 درصد (12 گونه) در ناحیه اروپا - سبیری (حوزه هیرکانی) و سایر گروه ها با مقادیر کمتر در منطقه پراکنش دارند.

کلمات کلیدی:

فلور دارویی، تنوع گونه ای، فندقلو، نمین، استان اردبیل

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/342505>

