

عنوان مقاله:

استفاده از درمان جایگزین بانیکوتین NRT در حاملگی

محل انتشار:

پنجمین همایش تازه های پرستاری و مامایی (سال: 1388)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسنده:

مأده محمدی فرد - دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خلاصه مقاله:

این مقاله با مروری بر مقالات موجود در سایت های معتبر علمی در اینترنت تهیه گردیده است بررسی درمان جایگزین نیکوتین مداخلات و موانع ترک سیگار و دیدگاه زنان درباره NRT در حاملگی پیش زمینه بسیاری از زنان در حاملگی مصرف سیگار را ادامه میدهند و نمیتوانند به تنهایی و به وسیله رفتار درمانی انگیزشی سیگار را ترک کنند این زنان به میزان زیادی به نیکوتین وابسته هستند و میتوانند از درمان جایگزین و بانیکوتین سود ببرند بنوترز و همکاران 2000 بیان کردند اگرچه سیگار کشیدن عوارض زیادی بر حاملگی دارد اما دقیقاً مشخص نیست که کدام ترکیب دود سیگار مخرب ترین عامل است نیکوتین یک سم شناخته شده در سطح سلول است که اثر تنگ کننده عروق دارد و با در نظر گرفتن اتصال مونوکسید کربن به هموگلوبین سبب آنمی عملکردی مادری می شود همچنین مونوکسید کربن میزان انتقال اکسیژن از مادر به جنین را کاهش میدهد و باعث بروز هیپوکسی در بافتهای جنین میشود تحقیقات نشان داده است که اعتیاد به سیگار به دلیل نیکوتین موجود در آن است که زنان را از ترک سیگار باز میدارد و بنابراین باعث عدم کنترل برجنه های مهم زندگی مانند حاملگی میشود اگرچه ممکن است خطراتی را در رابطه با NRT وجود داشته باشد اما NRT خطرات مرتبط با مونوکسید کربن و سایر مواد سمی را از بین می برد همچنین در بررسی های انجام شده بی خطری نسبی نیکوتین پوستی در مقابل سیگار مشخص شده است تحقیقات نشان داده است که حاملگی یک زمان ایده ال برای ترک سیگار است اما تعدادی از زنان قادر به ترک سیگار نیستند

کلمات کلیدی:

حاملگی / سیگار کشیدن / ترک سیگار / درمان جایگزین بانیکوتین

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/540762>

