

## عنوان مقاله:

شیوع استوماتیت بافتی عود کننده در دستیاران تخصصی پزشکی و دندانپزشکی علوم پزشکی قزوین در سال 1392-93

## محل انتشار:

اولین کنگره دانشجویی دندانپزشکی شمال کشور (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

## نویسندگان:

محمدرضا صمدی شادور - کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

کتایون برهان مجابی - دانشیار بیماری های دهان، فک و صورت

محمدعلی زحل - دانشیار بیماری های ریه گروه بیماری های داخلی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

مهديه زرابادی پور - استادیار بخش بیماری های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

آمنه باریکانی - استادیار گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

محمد صادقی - کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

## خلاصه مقاله:

سابقه وهدف: استئوماتیت آفتی عودکننده RAS یکی از شایع ترین زخم های مخاط دهان به شمار می رود که به شکل زخم های سفید رنگ کوچک بیضی یا دایره ای نمایان می شود ارتباط RAS و استرس های روحی روانی گزارش شده است. از آنجا که نتایج بدست آمده از تحقیقات انجام شده ناقص می باشند، هدف از انجام این تحقیق تعیین شیوع استوماتیت آفتی عودکننده و ارتباط آن با اضطراب است. مواد و روش ها: این مطالعه نوع توصیفی تحلیلی بر روی تعداد 100 نفر از دستیاران پزشکی و دندانپزشکی شهر قزوین در سال 92-93 انجام گرفته ست. پرسشنامه شامل دو بخش اطلاعات فردی از قبیل جنس، و نوع رشته پزشکی یا دندانپزشکی و بخش دیگر مربوط به زخم های آفتی از قبیل تجربه زخم ها، تعداد و مکان آنها در دو سال گذشته و نیز عوامل و شرایط مرتبط از قبیل آلرژی، استرس و مصرف دخانیات بود. درارزیابی اضطراب پنهان و آشکار در افراد مورد بررسی از پرسشنامه استاندارد State-Trait Anxiety Inventory استفاده شد. تحلیل آماری داده ها توسط نرم افزار spss در سطح معناداری انجام گرفت. یافته ها: به طور کلی شیوع RAS درمیان افراد مورد بررسی 34 درصد برآورد گردید که از این رقم، 26 درصد در دستیاران پزشکی و 8 درصد دندانپزشکی مشاهده شد. میزان شیوع RAS در میان مردها و زن ها فاقد اختلاف معنی داری بود.  $P > 0.05$  بیشترین میزان شیوع RAS در دستیاران پزشکی در گروه سنی 30-35 و 34/4 درصد بدست آمد. در 34 مورد RAS مشاهده شده در میان دستیاران پزشکی و دندانپزشکی 4 مورد 11/8 مورد به صورت متعدد و 30 مورد 88/2 درصد به صورت منفرد بودند. 91 درصد RAS در افراد مورد بررسی از نوع مینور، 3 درصد مازور و 6 درصد از نوع هرپتی فرم بودند که مخاط باکال با فراوانی 50 درصد، بیشترین فراوانی را داشت. 57 درصد دستیاران پزشکی و دندانپزشکی اضطراب را فاکتور اصلی در همزمانی بروز ضایعات آفتی در خود می دانستند. رابطه بین ابتلا به RAS و میزان اضطراب پنهان و آشکار با استفاده از پرسشنامه STAI، معنی دار یافت نشد.  $P = 0/34$  و  $P = 0/49$  نتیجه گیری: شیوع RAS در میان دستیاران تخصصی پزشکی و دندانپزشکی بالا بوده ارتباط ولی ارتباطی بین ابتلا به RAS و میزان اضطراب پنهان و آشکار وجود نداشت.

## کلمات کلیدی:

استوماتیت آفتی عودکننده، شیوع، اضطراب، دستیاران پزشکی و دندانپزشکی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

