سیویلیکا - ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها
گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا
CIVILICA.com

عنوان مقاله:
اثردرمانی طب فشاری درکاهش تهوع و استفراغ دوران بارداری

محل انتشار:
پنجمین همایش تازه های پرستاری و مامایی (سال: 1388)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:
زهرا رضایی - *دانشجوی رشته پرستاری*

پریسا مجدم - *دانشجوی رشته پرستاری*

الهام مومنی - *دانشجوی رشته پرستاری*

میترا ملایی نژاد - *عضو هیئت علمی گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی واحدخوراسگان*

خلاصه مقاله:
ازعوارض دوران بارداری تهوع و استفراغ NVP است که به بیش از50درصد خانمها دراین دوران ازآن رنج می برند اتیولوژی NVP نامعلوم و موردبحث است به دلیل عوارض داروهای صناعی و خطرات آن برای مادروجنین امروزه استفاده ازدرمانهای جایگزین موردتوجه قرارگرفته است این درمان ها دامنه ای ازویتامین درمانی پریدوکسین گیاه درمانی طب سوزنی و فشاری را دربرمیگیرد دراین مقاله به بررسی NVP عوارض NVP طولانی مدت همچنین طب فشاری و چگونگی تاثیرآن برNVP می پردازیم روش این پژوهش مطالعه مروری مقالات مرتبط باتاثیر طب فشاری برNVP می باشد تهوع و استفراغ بارداری در70درصد موارد بین هفته های 4تا6 بارداری شروع میشود و تاهفته های 12تا14 و حتی گاهی تاهفته 20بارداری هم ادامه دارد که اثرات عمیقی برعملکرد خانوادگی اجتماعی و شغلی زن باردار میگذارد و درموارد شدید و ماندگار ممکن است منجر به عدم تعادل الکترولیت ها و اختلالات متابولیکی میشود که برای مادرو جنین بسیاری خطرافرین است لذا کاهش NVP بسیارباهمیت می باشد ازانجا که برخی اززنان باردار ازدریافت هرنوع دارویی دردوره بارداری امتناع می کنند تنها راه مداخله دراین افراد استفاده ازدرمانهای غیردارویی ازجمله طب فشاری است که شاخه ای ازطب سوزنی است بااین تفاوت که درآن نیاز به استفاده ازسوزن جهت تحریک نقاط نمی باشد بلکه تحریک برروی نقطه نیگان P6 اعمال میشود تکانه های حسی حاصل ازتحریک این نقطه به نحوی مبهم به ساقه مغز منتقل میشود و تهوع و استفراغ را مهار می کنند

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

https://civilica.com/doc/540774