

## عنوان مقاله:

بررسی فراوانی فاکتورهای مرتبط با باروری در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده کلینیک روماتولوژی شهر رفسنجان در سال ۱۳۹۹

## محل انتشار:

مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره 25، شماره 5 (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

## نویسندگان:

دکتر زهرا کامیاب - واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع)، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران. استادیار گروه پزشک خانواده، بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

دکتر غلامرضا بازماندگان - واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع)، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران. استادیار گروه پزشک خانواده، بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

دکتر فاطمه ناظم کازرانی - استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

بتول غضنفری - دانشجوی پزشکی، واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع)، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

دکتر میترا عباسی فرد - واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع)، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران. استادیار گروه داخلی، بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

## خلاصه مقاله:

مقدمه: آرتریت روماتوئید، بیماری مزمنی است که اتیولوژی ناشناخته دارد و می تواند بر ابعاد مختلف زندگی زنان به خصوص دوران بارداری و پیامدهای آنها تاثیر گذار باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی فاکتورهای مرتبط با باروری در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید انجام شد. روش کار: این مطالعه توصیفی-تحلیلی در سال ۱۳۹۹ بر روی ۱۰۰ زن مبتلا به آرتریت روماتوئید و ۱۰۰ زن سالم اجرا شد. تشخیص آرتریت روماتوئید بر اساس معیارهای ACR ۲۰۱۰/EULAR و تایید روماتولوژیست بود. اطلاعات دموگرافیک و مرتبط با باروری شامل سن اولین قاعدگی، سن منوپوز، نظم قاعدگی، تعداد بارداری، سابقه ناباروری، مصرف داروهای کمک باروری، طول مدت ناباروری و شدت بیماری بر اساس معیار DAS.۲۸ بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۲۰) و آزمون های آماری تی مستقل و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از ۰/۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: میانگین مدت ابتلاء به بیماری ۱۴/۴۹±۵۷/۴۹ ماه و شدت بیماری در نیمی از بیماران متوسط بود. تعداد بارداری و زایمان بین دو گروه اختلاف معنی داری نداشت (۰/۰۵).

## کلمات کلیدی:

آرتریت، بارداری، سقط، قاعدگی، ناباروری

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1505600>



