

عنوان مقاله:

بررسی فراوانی آلودگی به شپش سر در دانش آموزان شهر سنج و عوامل مرتبط با آن در سال 1395-96

محل انتشار:

نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسندگان:

احمد وهابی - استادیار گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

هیوا محمدی - اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 سنندج، سنندج، ایران

شیلان لطیفی - مرکز بهداشت شهرستان سنندج، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

بشری وهابی - کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: شپش سر از حشرات است که به عنوان انگل خارجی بدن انسان مطرح بوده و امروزه به عنوان یکی از معضلات بهداشتی در جوامع مختلف مطرح می باشد. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی آلودگی به شپش سر در دانش آموزان متوسطه شهر سنج و عوامل مرتبط با آن در سال 1395-96 انجام گردید. مواد روش ها: این مطالعه یک بررسی توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بود. جامعه آماری این مطالعه دانش آموزان مقاطع متوسطه شهر سنج بودند که با استفاده از روش تصادفی خوشه ای 802 نفر از آن ها مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی وجود آلودگی به شپش سر، قسمتهای مختلف سر به ویژه پشت گوش و پشت سر دانش آموزان توسط محققین معاینه شده و وجود شپش زنده یا تخم شپش بر روی سر دانش آموز به منزله آلودگی دانش آموز به شپش سر تلقی گردید. برای این منظور از پرسشنامه ای که قبلا در مطالعات دیگران استفاده شده بود، استفاده گردید. برای این منظور از پرسشنامه ای استاندارد شده که قبلا در مطالعات دیگران استفاده شده بود، استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 20 استفاده شد. برای توصیف داده ها از فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده گردید. از آزمون آماری کای اسکور برای بررسی رابطه بین متغیرهای مورد بررسی و آلودگی به شپش سر در بین دانش آموزان استفاده شد. یافته ها: از مجموع 802 نفر دانش آموز مقطع متوسطه بررسی شده شهر سنج، 478 نفر (59/6%) در مقطع متوسطه اول و 324 نفر (40/4%) در مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل بودند. دویست و چهل نفر (29/9%) از دانش آموزان معاینه شده، پسر و بقیه آن ها، دختر بودند. 585 نفر (72/9%) دارای مری بهداشت در مدرسه بوده و بقیه آنها در مدارس درس می خواندند که فاقد مری بهداشت بودند. از کل دانش آموزان معاینه شده، 26/7 درصد آنها به شپش سر آلوده بودند. بیشترین میزان آلودگی در دانش آموزان پایه دوازدهم و کمترین آن در پایه یازدهم مشاهده گردید. آنالیز آماری نشان داد که بین پایه تحصیلی و آلودگی به شپش سر ($p=0/001$ ؛ $x^2=73/08$)، سن دانش آموز و آلودگی به شپش سر ($p<0/001$)؛ داشتن مری بهداشت و آلودگی به شپش سر ($p=0/001$ ؛ $x^2=51/92$)، سواد پدر و آلودگی به شپش سر ($p=0/019$ ؛ $x^2=13/49$)، خارش سر و آلودگی به شپش سر ($p<0/001$ ؛ $x^2=14/94$) و استفاده از لباس مشترک و آلودگی به شپش سر ($p=0/04$ ؛ $x^2=3/47$)، رابطه آماری معنی دار وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج مطالعه بیان کننده آن است که عدم توجه والدین به بهداشت فردی دانش آموزان و همچنین عدم توجه دانش آموزان به بهداشت فردی خود سبب افزایش میزان آلودگی به شپش سر در بین دانش آموزان شده است. برگزاری کلاس های آموزشی به منظور ارتقای دانش و نگرش دانش آموزان والدین آنها نسبت به شپش سر توصیه می شود.

کلمات کلیدی:

شپش سر، آلودگی، فراوانی، دانش آموز، پدیکولوزیس

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/809980>

