

عنوان مقاله:

تشخیص CVCT با استفاده از اولتراسونوگرافی

محل انتشار:

شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسنده:

مهدی محمودی - دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

خلاصه مقاله:

تشخیص ترومبوز ورید میانخالی خلفی با استفاده از اولتراسونوگرافی ترومبوز ورید میانخالی خلفی در گاو، سندرمی است مشخص ممکن است با چهره های بالینی متفاوتی مانند مرگ ناگهانی به دنبال پارگی آبسه های کبدی ترومبوز شریان ریوی پنومونی چرکی نارسایی قلب راست اندوکاردیت خون دماغ ظاهر شود بیماری ممکن است پی آیندی از بیماری های سپتیک مانند اسیدوز شکمبه ترومبوفلیت ورم پستان متريت يا گندیدگی سم باشد که در ارتباط با آبسه های کبدی و گسترش عفونت به ورید میانخالی خلفی است. ورید میانخالی خلفی در گاو درست راست در فضای بین دنده ای 11 تا 12 با استفاده از مگاهرتزهای 2/5 تا 7/5 قابل بررسی است. در حالت نرمال شکل طبیعی ورید میانخالی خلفی مثلی شکل می باشد (شکل 1-1). ولی به دنبال ترومبوز ورید میانخالی خلفی، گرد یا بیضی شکل می شود که ناشی از افزایش قطر ورید میانخالی خلفی به دلیل حضور ترومبوز است (شکل 1-2). ترومبوز به ندرت از طریق سونوگرافی قابل مشاهده است چون معمولا ترومبوز در قسمت قدامی ورید است که توسط ریه ها پوشانده می شود ولی در صورت مشاهده بصورت یک توده گرد اکوژنیک در ورید میانخالی خلفی دیده می شود (شکل 1-2). معمولا به دنبال بررسی اولتراسونوگرافیک کبد، آبسه های کبدی به صورت توده های هاپیو اکوئیک در پارانشیم کبد قابل مشاهده است. بررسی اولتراسونوگرافیکی ریه، علایم برونکوپنومونی چرکی همانند comet-tail (ستاره دنباله دار) آبسه های ریوی را بروز می دهد.

کلمات کلیدی:

ترومبوز ورید میانخالی خلفی اولتراسونوگرافی - اسیدوز شکمبه

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/840748>

